

A. Engler

1879, Bull. Soc. Ort. Toscane 4 : 301-302

Cryptocoryne Fischer.

62. C. CILIATA Fisch.

Borneo, Ragiato di Sarawak: Beccari Piante Born. n. 619, 1067.

63. C. CORDATA Griff.

Borneo, Ragiato di Sarawak: Beccari Piante Born. n. 170.

64. C. STRIOLATA Engl. petiolis lamina circ. triplo longioribus, *lamina oblongo-ovata, basi leviter emarginata, minute striolata* aequa punctulata, nervis lateralibus utrinque 2 prope basin nascentibus, adscendentibus; pedunculo distineto; *spatha* folia tota longitudine subaequante *longe tubulosa, in limbum linearem acutum* angustata; tubo inflorescentiam includente brevissimo, a tubo superiore multoties longiore plica separato; inflorescentia feminea a mascula interstitio longo nudo separata. — A priore, cui similis, differt foliorum lamina magis oblonga, striolata atque spathae limbo magis producto.

Borneo, Ragiato di Sarawak: Beccari Piante Born. n. 1240.

65. C. PALLIDINERVIA Engl. caudiculo brevi stolones longos emitente; foliorum petiolis quam lamina duplo triplove longioribus, tenuibus, *lamina ovata obtusa, basi cordata, nervis lateralibus* utrinque 3 prope basin nascentibus adscendentibus, *cum costa pallidis*; pedunculo brevissimo cum spathae parte inferiore folii vagina inclusa; *spatha* sere ad apicem usque tubulosa, petoli dimidium aequante, parte insima ovali vel oblonga inflorescentiam includente quam media anguste cylindrica 5-6-plo breviore, suprema mediae subaequilonga elongato-susiformi, longe acuminata fissura angusta hante; inflorescentia feminea monocyclica a mascula interstitio brevi sejuncta.

Borneo, Ragiato di Sarawak: Beccari Piante Born. n. 3857.

66. C. LINGUA Beccari (mpt.) caudiculo stolones longos emittente; foliorum petiolis quam lamina paullo longioribus planis, *lamina ovata vel oblongo-ovata sensim in petiolum transeunte*, nervis lateralibus utrinque 3-4 costae subparallelis instructa; *spathae petiolum superantis, tubulosae parte insima inflorescentiam includente quam intermedia anguste cylindrica 1 1/2-plo breviore, suprema parte inferne inflata in acumen multo longius producta*; inflorescentia feminea a mascula interstitio longulo sejunta.

Borneo, Ragiato di Sarawak: Beccari Piante Born. n. 3998.

67. C. SPATHULATA Engl. foliorum petiolis quam lamina brevio-

ribus planis dilatatis, lamina ovata basi lata in petiolum contracta; pedunculo brevissimo; spathae folia superantis, tubulosae infima parte inflorescentiam includente mediae anguste cylindricae aequilonga, suprema parte dilatata in acumen lineare totius spathae dimidium sere aquans exente.

Borneo, Ragiato di Sarawak: Beccari Piante Born. n. 3917.

68. C. LONGICUDA Becc. (mpt.) petiolis quam lamina duplo longioribus, lamina ovata, basi cordata, nervis lateralibus utrinque 2-3 adscendentibus, spatha quam folia plus duplo longiore, breviter pedunculata, infima parte inflorescentiam includente quam intermedia cylindrica triplo breviore, suprema aperta (limbo) inferne ovata, deinde in acumen reliqua spatha longius, lineare contracta.

Descriptio ex delineatione cli. Beccarii.

Borneo, Ragiato di Sarawak: Beccari.

69. C. BULLOSA Becc. (mpt.) caudiculo crassiusculo stolonifero; foliorum petiolis laminae subaequilongis, lamina oblongo-lanceolata, basi leviter cordata, nervis lateralibus I. utrinque 2 e basi adscendentibus apicem petentibus, venis transversis inter se conjunctis, *diachymate inter venas bullato*; spathae petiolum paullo superantis tubulosae infima parte vagina inclusa, limbo lanceolato breviter acuminato. — Species lamina bullosa valde insignis.

Borneo, Ragiato di Sarawak: Beccari Piante Born. n. 3487.

70. C. AURICULATA Engl. caudiculo brevissimo, foliis patentibus; petiolis quam lamina brevioribus planis, lamina oblonga, basi breviter auriculata, apice acuta, nervis lateralibus 2 adscendentibus vix prominulis; pedunculo brevi; spathae quam folia paulo breviore limbo lanceolato, acuminato tubo aequilongo, tubi dimidio inferiore inflorescentiam includente, inflorescentia seminea a mascula interstitio longulo separata.

Borneo, Ragiato di Sarawak: Beccari Piante Born. n. 3845.

71. C. FERRUGINEA Engl. caudiculo brevissimo, petiolis laminae subaequilongis, lamina supra glabra, pallide viridi, subtus ferrugineo-puberula, oblongo-cordato-ovata, apice acuta, nervis lateralibus utrinque 2 adscendentibus; pedunculo brevi; spathae folia aequantibus tubo oblongo, inferne inflato sursum angustato, limbo tubo aequilongo fere tota longitudine linearis; inflorescentia seminea a mascula interstitio longissimo nudo separata. — Ab omnibus speciebus foliis pubescentibus aquae spathae tubo fere omnino clauso distincta.

Borneo, Ragiato di Sarawak: Beccari Piante Born. n. 3983.