

LINNAEA.

Ein

Journal für die Botanik in ihrem ganzen Umfange.

Herausgegeben

von

D. F. L. von Schlechtendal,

der Med. Chir. und Philos. Dr., Professor an der Universität zu Berlin und mehrerer
gelehrten Gesellschaften Mitglied.

Fünfter Band. Jahrgang 1830.

Mit elf Kupferstafeln.

Berlin 1830.

Gedruckt auf Kosten des Herausgebers.

In Commission bei L. Oehmigke.



PLANTARUM QUARUNDAM DESCRIPTIONES

AUCTORE

H. WYDLER, TIGURINO - HELVETO.

GOETZEA Wydler.

Novum plantarum genus, c. tab. VIII.

Arbuscula e familia Ebenacearum, dixi in honorem
la. Vez. Ephr. Goetze, pastori olim Quedlinburgensi, na-
tus scrutatori felicissimo, cuius scripta in prima mea ju-
ventute mihi nutrimentum spiritus praebuerunt suavissimi-
mum saluberrimumque.

Speciei descriptio: Goetza elegans.

*T*erminus arborescens, erectus, cortice glabro, ramosis-
simus, ramis sparsis erectiusculis.

Folia alterna; breviter petiolata, pollicaria, bipinnata ultra, petiolis multo brevioribus, pilis adpressis fer-
tiles, ovata, utrinque acuta, interdum apice retusa, pen-
natiservia. nervis parallelis marginibus folii anastomosanti-
tigata, nervo medio subtus prominente, ferrugi-
nibus abundulata, integerrima, glaberrima, nitida.

Ligules vix pollicem longi, axillares, plures, pedicel-
latis minus penduli, elegantissimi.

Pedicelli breves, semipollicares, teretes.

Calyx corolla quadruplo brevior, gamosepalus, basi
ventricosus, subcampanulatus, supra medium
contractus, sexfidus, lobis acqualibus, corollae ad-
spicere lanceolatis, acutis, erectis, intus cum fundo caly-

lata, petiolo longo membranaceo, basi dilatato; limbo angusto-lanceolato acuminato, sinuato-acute-dentato, glabro, dentibus patulis gracilibus basin respicientibus, sinubus tenuissime ciliatis, nervo intermedio latiusculo. *Rami foliiferi* nulli. *Inflorescentia* corymbosa. *Bracteae* foliis similes sed minores, 2—1 pollicares, a basi lata caule semiamplexenti sensim angustata, lanceolata, acuta, dentata, summa saepe integerrima, plus minus villosa. *Rami florales* maximam partem caulis occupantes, alterni, axillares, breves, a basi ad apicem caulis longitudine decrescentes, inferiores $1\frac{1}{2}$ poll. longi, patuli, angulum acutum efficientes, superiores breviores cauli subadpressi, apice plus minus incrassati villosi. *Efflorescentia* ramorum laterum centrifuga, capitulorum centripeta. *Capitulum magnum.* *Involucri* foliola (bracteolae steriles) semipollicaria, lanceolata, acuta, vix appendiculata, villosiuscula, ciliata, colorata. *Receptaculi paleae* lutescentes, lineare longae. Corolla majuscula purpurea. Obs. Pars bracteolarum sterilium inferior, continua verus petiolus mihi esse videtur, pars autem apicalis s. appendicularis limbi foliei rudimentum.

CRYPTOCORYNE Fischer.

Nomen a *κρυπτός* occultus et *κρύψη* clava.

Genus singularissimum Ambrosiniae generi solummodo affine, unica specie ab auctoribus sub *Aro* enumerata ^{et} huc constans. *Ambrosinia retrospiralis* et *ciliata* Roxb. bengal., mihi plane ignotae, an ad genus nostrum ^{re}rendae?

1. CRYPTOCORYNE *spiralis* Fisch. ⁴⁸⁶

Arum spirale Retz obs. 1. n. 103., Willd. sp. 4. p. ⁴⁸⁶ n. 24., Sims bot. mag. t. 2220. ⁶⁵

Ambrosinia spiralis Roxb. hort. bengal. (1814) p. ⁶⁵

Descriptio: Radix fasciculata, fibris fere pedalibus, teretibus albescensibus, crassiusculis, ramulis filiformibus, stolonifera, stolonibus longis, nodosis, squamatis, fibrillas plurimas emittentibus.

Caulis abbreviatus.

Folia omnia radicalia, petiolata, semipedalia et ultra, vernatione a latere spiraliter imbricato-involuta. *Petoli* basi vaginantes, vaginis latis membranaceis, sulcatis, albescensibus, dein semiteretes, solidi, purpurascentes. *Limbus* folii oblongo-lanceolatus, leviter sulcatus, acuminatus, marginibus saepe crispus, undulatus, nervo intermedio late, subtus prominente, pallide viridis.

Spathae 1—2, radicales ex axillis foliorum erumpentes, suaveolentes, pedicellatae. *Pedicelli* breves, crassiusculi, semiteretes s. obsolete trigoni, glaberrimi. Inferior pars spathae tubulosa, tubo inter foliorum axillas inclusa, subterraneo, crasso, trigono, semipollucari, albo, ad orificium ejus hinc compressiusculo, illinc ventricoso et hic spatha spiraliter torta; superior longe producta, lanceolata, marginalia, marginibus crassiusculis in acumen longum herbaceum desinens, cuius margo posterior iterum spiraliter tortus est. Facies ejus exterior, ad tubi instar in longitudinem parallele striata; facies interior obscure s. fusco-purpurea est, concava, sulco longitudinali notata, plicis quatuor transversalibus parallelis, undulatis, quarum inferiores magis sunt productae quam superiores. Hae longitudine sensim sensimque decrescant. Plicae praesertim inferiores ad spathae margines in denticulos saepe laceros, herbaceos, coloratos desinunt. Caeterum colore gaudent et raro; plicae inferiores luteae, intermediae purpureae, superiores pallidiores. Orificium tubi plica clausum est ~~caeca~~, omnium maxime producta, cuius margo posterior ~~caeruleam~~ efficit membranaceam, diaphanam, in centrum tubi dependentem, quae latere exteriore tecta est parte

eiusdem plicae anteriore et paulo inferiore. Auricula est ovata, colore albo, texturam habet teneram corollinam et faciem interiorem concavam; haec spadicis partem antheriferam partim obtagit.

Ex medio spathae et parte ejus tubulosa inclusus, *spadix* surgit 12—14 lin. longus, inferne foemineus, medio nudus, gracillimus 5—6 lin. longus, teres, glaber, albus, purpureo-striatus, apice valde incrassatus, antheriferus, vertice suo cum plica infima (tubum claudente) membrana conjunctus.

Ovarium conicum, 2—3 lin. longum, glabrum, albidum, sexloculare, ovulis multis in quoque loculo, biserratim dispositis, lateribus compressiusculis, placentae centrali crassiusculae affixis.

Styli duodecim, biseriales, radiatim dispositi, seriei exterioris styli crassi, triquetri, uti ovarium purpureo-punctati, seriei interioris angustiores, omnes glabri.

Stigmata exteriora extrorsa, peltata, marginata, impresso-concaviuscula, interiora a praecedentibus paulo diversa, minus evoluta.

Stamina: Filamenta nulla. *Antherae* spadicis partem terminalem valde incrassatam obtegentes et capitulum ovatum formantes, sine ullo ordine dispositae. Quaque anthera fere cyathiformis, bilocularis, emarginata, erecta; loculis amplis cellulaeformibus marginatis, septo valde distincto separatis. In quoque loculo corpusculum (pollen?) teres, conicum, a basi ad medium crassiusculum, apicem versus attenuatum, clavatum, exsertum, post anthesin deliquescentes. Quamquam planta adhuc flores ad centenos in horto nostro produxit, nunquam *fructus* fert.

Habitat in India orientali; „in Tranquebaria Retz.“ verosimiliter in China (ex bot. mag.) 24. Floret sub dio in horto imperiali Petropolitano.